

## Un nuevo «*Otiorrhynchus*» ibérico (Col. Curculionidae)

POR

M. GONZALEZ

Al revisar últimamente los *Otiorrhynchus* ibéricos reunidos en el Museo de Zoología de Barcelona y en mi colección, me he encontrado con una serie de ejemplares, todos ellos procedentes de la provincia de Tarragona, cuyos caracteres no coinciden con ninguna de las especies por mí conocidas; convencido se trata de una novedad consulté no obstante la autorizada opinión de mi excelente colega A. ROUDIER, quien ha confirmado mi punto de vista. Antes de ocuparme de su descripción quiero expresar mi agradecimiento al mencionado especialista a quien soy deudor de inapreciable ayuda y prolongado asesoramiento. Agradecimiento que hago extensivo al Sr. F. ESPAÑOL, a cuya amabilidad debo mi formación entomológica y el haber podido consultar la biblioteca y colecciones del Museo de Zoología, ayuda que me ha sido utilísima en la preparación del presente trabajo. Agradezco asimismo el Sr. VILELLA la cesión de parte del material de la repetida novedad recogido por él en la Mola de Coldejou, Tarragona.

### *Otiorrhynchus* (s. str.) *roudieri* n. sp.

Por ser ♂ y ♀ de la misma anchura, poseer la parte superior del cuerpo pubescente, el pronoto tuberculado y los élitros con estrías de puntos bien marcadas, la presente especie debe figurar en la segunda división de Reitter.

Holotipo ♂: Long. 11 mm., anchura máx. 4,50 mm. Oblongo, ensanchado en los élitros, negro, fémures rojizos, la articulación de éstos así como las tibias y tarsos bastante más oscurecidos; revestido de corta pubescencia filiforme gris amarillenta, más densa sobre los élitros, dando a éstos un aspecto pulverulento; las estrías elitrales presentan una pubescencia dispuesta irregularmente, algo más gruesa que la de los intervalos y agrupada a modo de pequeños pinceles, poco numerosos y de un ligero tono metálico verde o dorado.

Rostro tan largo como ancho, débilmente cónico, con las quillas laterales borradas hacia la mitad de éste. Frente provista de una foveola fina pero muy aparente; espacio interocular algo más estrecho que el rostro entre la inserción de las antenas. Ojos pequeños, redondos, poco salientes y nada convexos. Antenas largas, gráciles; escapo tan largo como los cinco primeros artejos del funículo, recto y bruscamente engrosado en la extremidad; 2.º artejo del funículo un tercio

más largo que el 1.º; del 1.º al 4.º algo más engrosados en el ápice que los restantes; maza larga igual en longitud al 2.º artejo del funículo.

Pronoto tuberculado, algo más largo que ancho, con su máxima anchura antes del medio, más estrecho en su parte anterior que en la base; ángulos anteriores y posteriores vivos; lados bruscamente estrechados a partir del segundo tercio de su longitud.

Élitros oblongo elípticos, con los húmeros borrados, planos por encima, la declividad apical brusca, el ápice poco acuminado, estrias con puntos bien aparentes, separados por gránulos irregulares; intervalos subplanos y cubiertos también de gránulos apenas aplastados.




Fig. 1. *Otiorrhynchus* (s. str.) *roudiei* n. sp.

Quinto segmento abdominal con estriación longitudinal fina y regular.

Organo copulador ♂ fig. 2.

Alotipo ♀: Long. 12 mm., anch. máx. 5 mm. Difiere del ♂ por el rostro más corto y transversal; por los élitros más planos por encima, con los húmeros avanzados hacia la base y el declive apical más brusco; y por el quinto segmento abdominal sin caracteres especiales.

Resulta interesante señalar, que entre las ♀♀ disponibles destaca una procedente de Mola de Coldejou por causa de su reducido tamaño (long. 9 mm., anch. máx. 3,50) pero completamente de acuerdo por los restantes caracteres con los otros ejemplares.

Próximo a *pyrenaicus* GYLL., *salicicola* HEYD, *armadillo* ROSSI., *ghiliani* FAIRM. y *auropunctatus* GYLL., por el 2.º artejo del funículo un tercio más largo que el 1.º, pero diferente de los tres primeros, por

el protórax nada transverso y rápidamente estrecho en la base, como también por la particular conformación de los élitros. Difiere a su vez del *ghiliani*, por el rostro y el 2.º artejo del funículo netamente más cortos, y por el contorno diferente del protórax y élitros. Separado, en fin, de *auropunctatus* por la talla mayor, el aspecto diferente,




Fig. 2-6. Órgano cop. ♂ a, parte ventral, b, parte lateral, en 2 *Otiorrhynchus* (s. str.) *roudiei* n. sp.; 3, *O.* (s. str.) *pyrenaicus* Gyll.; 4, *O.* (s. str.) *salicicola* Heyden.; 5, *O.* (s. str.) *armadillo* Rossi.; 6, *O.* (s. str.) *auropunctatus* Gyll.

el rostro más largo y menos transverso, los artejos del funículo menos engrosados en el ápice, por el contorno distinto del protórax, etc.

Holotipo: 1 ♂, Mola de Colldejou, Tarragona 12-XI-61 (M. VILELLA), en mi colección.

Paratipos: 8 ejemplares (4 ♂♂ y 4 ♀♀) de la misma localidad y fecha (M. VILELLA), 30-IV-57 (F. ESPAÑOL); 2 ejemplares (♂ y ♀), Font Grossa, Farena, Tarragona, 12-X-57 (F. ESPAÑOL); 1 ♂ Esplugu de Francolí, Tarragona, 25-V-22 (NOVELLAS). En el Museo de Zoología de Barcelona y en las colecciones del Dr. A. ROUDIER y mía.