

Contribución a un estudio ornitológico de Banyoles, su lago y comarca (Prov. Gerona)

POR

J. M.^a MASSIP GIBERT

de la Sociedad Española de Ornitología

I — INTRODUCCIÓN

La presente contribución ornitológica pretende establecer una relación, lo más completa posible, de las especies de aves silvestres, tanto sedentarias como migrantes, halladas hasta el presente en Banyoles, su lago y comarca.

Banyoles dista unos 17 km. de Gerona capital y unos 120 de Barcelona. Su famoso lago, declarado Paraje Pintoresco Nacional en 22-7-1951, existe desde hace 350.000 años según autorizados estudios en los que se hace constar también que su superficie fue unas veinte veces mayor que en la actualidad.

La célebre mandíbula fósil de hombre neanderthaloide (col. Alsius), procede de 2.000 siglos atrás.

II — SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y OROGRAFÍA


Banyoles está situada en el NW. de la provincia de Gerona. Pertenece a la comarca de El Gironès aunque no faltan opiniones autorizadas que consideran a esta parte como formando por sí sola una comarca, ya que sus condiciones determinantes pueden muy bien delimitar el territorio.

Está situada en el fondo de una concha montañosa cuyos festones contiguos los forman pequeños accidentes del terreno representados por las colinas de Pujalts, Borgonyà, Puigpalter, Puig de la Bellacasa, Mas Usall, Porqueres y Camós. Esta concha queda algo abierta por la parte de Cornellà del Terri, que a su vez está protegida por otras cordilleras envolventes que, con los nombres de Mare de Déu del Mont, Bassegoda, Rocacorba y Mare de Déu dels Angels, forman las partes más altas de los contornos.

La ciudad se halla a los 6° 23' de longitud E. del meridiano de Madrid y a los 42° 5' de latitud N. Su altura se estima en unos 175 m.s.m.

III - VEGETACIÓN

Aparte de las frondosas alamedas y grandes arboledas de plátanos que sombrean los paseos del Lago, «Passeig Dalmau» y Fontpudosa,



bosquecillos de acacias, cipreses, sauces llorones, fresnos y unos pocos cinamomos se sitúan muy repartidos por distintos lugares.

En los bosques de la comarca abundan pinos y encinas, así como también algunos castaños.

Por las condiciones climáticas y abundancia de aguas, son innumerables las especies de plantas y, por ello, solamente enumeraremos las que tengan relación más directa con los diversos habitats de la avifauna de la zona. Abundan diversas especies de tifáceas como la espadana (en catalán, balca) y es muy común el junco (junc). Las graníneas están representadas por numerosísimas especies, entre ellas *Cynodon dactylon*, *Andropogon hirtum*, *Sorghum halepense*, *Phragmites communis* y *Arundo donax*; entre las cultivadas se hallan el trigo, cebada, centeno, avena, maíz, mijo, paizo, sorgo, etc.

En los lugares más secos, aunque situados muy próximos al lago y cuyo terreno es pizarroso, abundan el romero, la aulaga, la retama, etc.

IV - MATERIALES

Los datos recogidos se basan en su mayoría en observaciones personales del autor, si bien se ha ejercido asimismo un control de las aves disecadas, interrogando a cada uno de los cazadores con lo que hemos podido obtener valiosas informaciones sobre habitat de numerosas especies de mayor dificultad de observación.

Por otra parte, la actividad de taxidermista desarrollada durante bastante tiempo por el autor, ha permitido conocer a fondo otros muchos aspectos de las diversas especies y su mayor o menor abundancia. Debemos destacar, en este punto, las desinteresadas colaboraciones que hemos recibido, de modo entusiasta, de las personas que citamos al final del presente trabajo.

V - MÉTODO

La lista de especies está ordenada siguiendo la Lista-Patrón de la Sociedad Española de Ornitología, cuya nomenclatura científica y castellana hemos asimismo utilizado (según el «*Prontuario de la Avesfauna Española*», de F. BERNIS).

Los nombres catalanes son los de la Lista-Patrón de la Sección Regional Catalana de la S.E.O., viniendo luego reseñados los nombres locales después del calificativo Loc. Cuando éste no se cita debe entenderse que coinciden los nombres catalán y local.

En los nombres de lugares, se ha partido de la base gramatical y etimológica correctas en el idioma catalán, como corresponde por la zona estudiada, evitando así las tan frecuentes incorrecciones en sus traducciones al castellano.

Las especies nidificantes se distinguen de acuerdo con la siguiente clave:

Negritas todas: Nidificación comprobada.

Negrita inicial: Nidificación indudable pero no comprobada.

* **Asterisco**: Nidificación verosímil.

Indicamos, asimismo, la relativa abundancia o escasez de cada especie según la siguiente clave:

(MA) : Muy abundante

(A) : Abundante

(E) : Escasa

(R) : Rara

(RR) : Rarísima

Si en algún caso creemos que alguna especie viene sufriendo variación en su abundancia, lo hacemos constar igualmente indicando, por ejemplo : (A) a (E) (o sea, de abundante a escasa).

VI - LISTA SISTEMÁTICA DE ESPECIES

1. *Ardea cinerea*. Garza Real. Cat.: Bernat pescaire. (E)

Se han observado o capturado algunos ejemplares en épocas de migración.

- Usall, 2-2-65, naturalizado.
Espolla (Fontcoberta), 3-3-67, imposible naturalizarlo por heridas.
Banyoles, 23-10-69, vistos 2 ej. en vuelo.
Banyoles, 6-10-70, observado ej. solitario emprendiendo el vuelo desde la orilla E. del lago.
Fares, río Fluvià, 19-9-71, observación de 14 ej. También en 26-9-71.
El 3-10-71, día de apertura oficial de la caza, no conseguimos ver ningún ejemplar.
2. *Ardea purpurea*. Garza Imperial. Cat.: Agró roig. (R)
Besalú, 14-10-69, ej. muerto de pedrada. Naturalizado y en col. particular.
3. *Ardeola ralloides*. Garcilla Cangrejera. Cat.: Martinet ros. (E)
Estanyol del Vilar, 18-9-68, visto un ej. saliendo de unos juncos repetidas veces en densa zona pantanosa.
4. *Nycticorax nycticorax*. Martinete. Cat.: Martinet de nit. (E)
Parajes de «El Vilar», 20-11-66, visto un ej. en las cercanías.
Fares, río Fluvià, 19-9-71, posible observación a distancia.
5. *Ixobrychus minutus*. Avetorillo Común. Cat.: Martinet menut. (A)
Banyoles, 2-10-54, captura de una hembra herida, en el huerto particular de nuestro domicilio. Naturalizada. (Col. Massip).
Banyoles, 3-9-60, captura de una hembra cerca del Monasterio de San Esteban. Naturalizada y en col. particular.
Banyoles, 4-1-70, visto un ej. junto al lago. Hembra.
Banyoles, 6-1-70, identificamos un ej. macho, en el lago, cerca del lugar denominado «Cap de Bou».
Fares, río Fluvià, 19-9-71, observado un ej. joven, con plumaje muy poco uniforme.
Banyoles, Estanyol de la Cendra, 11-5-72, hallado nido conteniendo 3 huevos, uno ya roto y saliendo el pollo y dos sin eclosionar aun. Vista también la hembra.
6. *Botaurus stellaris*. Avetoro Común. Cat.: Bitó comú. (R)
Fontcoberta, 2-10-67, ave capturada viva, con una cesta, por Joan Casellas de Can Pelador. Pese a intentar alimentarla murió y fue naturalizada.
Banyoles, 21-11-71, observación de un ej. cerca de Porqueres.
7. *Ciconia ciconia*. Cigüeña Común. Cat.: Cigonya blanca. (E)
Podemos señalar como ocasionales las visitas de esta ave.
En el Museo Municipal Darder hay conservado un ejemplar muerto en el Pla de Martís y que, según nuestras indagaciones, fue llevado a dicho Museo en 1952.
Banyoles, 1965, fue capturado un individuo, anillado por la Sociedad Francesa de Ornitología, vivo y sin herida alguna. La captura se realizó de noche y con una linterna. El cazador escribió a la citada Sociedad, recibiendo acuse de recibo. Al ave se le cortaron las plumas de las alas y el propietario la tuvo compartiendo el pescado con un gato, al cual la Cigüeña daba picotazos si pretendía comer antes que ella. Al mudar el plumaje, salieron nuevas remiges primarias y el ave voló.

Vilert (Esponellà), septiembre 1968, fueron observados y fotografiados dos ejemplares que se posaron en el tejado de Cal Anglada.

8. *Anas platyrhynchos*. Anade Real. Cat.: Ànec coll-verd. (A)

Son capturados muy frecuentemente pero, por su sabrosa carne, pocos son los que se naturalizan. Las observaciones y ejemplares cobrados coinciden fundamentalmente entre los meses de noviembre a enero y parte de febrero. Sin embargo, son significativas las citas en el río Fluvià, donde anidan.

Fares (río Fluvià), 6-7-71, 27-9-71 y 3-10-71, observados 12 ej. en diversos puntos del río. En ocasiones las hembras graznan fuertemente.

Hay también observaciones en el lago de Banyoles. Hemos visto en algún punto del área estudiada, nidos ya abandonados. Por otra parte, hemos comprobado la captura de pollos en Fares.

9. *Anas crecca*. Cerceta Común. Cat.: Xarxet comú. (E) o (A) según años.

Espolla (Fontcoberta), 2-1-69, observado en el lago intermitente de dicha localidad.

Banyoles, 1971, varias citas en el lago durante todo febrero.

10. *Anas clypeata*. Pato Cuchara. Cat.: Ànec cullerot. (R)

Espolla, 5-6-72, observado un macho en la laguna intermitente. Asustado por el brillo de los prismáticos —suponemos—, levanta el vuelo algo pesado pero rápido. Durante tres días consecutivos fue observado el mismo ejemplar solitario.

11. *Pernis apivorus*. Halcón Abejero. Cat.: Falcó vesper. (R)

Banyoles, 14-1-68, fue muerto y naturalizado un ej. cuya caza tuvo lugar en la carretera de Figueres, a 1 km. de Banyoles. Única cita.

12. *Milvus milvus*. Milano Real. Cat.: Milà real. (RR)

Crespà, 27-7-69, por su silueta y cola muy ahorquillada creímos identificar un ej. capturando un gorrion en vuelo. Carecemos de datos de cría que, por la fecha de observación parece posible.

13. **Milvus migrans*. Milano Negro. Cat.: Milà negre. (R)

Mieres, 18-9-72, capturado y naturalizado un ejemplar. Pese a su rareza, su cría es verosímil.

14. *Accipiter gentilis*. Azor. Cat.: Astor. (A)

Señalamos como abundante a esta especie teniendo en cuenta la comparativa escasez de la misma en otras zonas. Podemos decir, con seguridad, que juntamente con el Gavilán y exceptuando las rapaces nocturnas, es una de las especies de aves de presa de las que mayor número de ejemplares se observan y, desgraciadamente, a menudo capturan.

Sant Miquel de Campmajor, 28-12-69, muerto y naturalizado un ejemplar.

Porqueres, 28-12-69, observado en Can Morgat un ej. probablemente hembra, posado en lo alto de un pino.

La Perpinyana, 30-12-69, un ej. muerto y naturalizado.

Vilavenut, 1-11-70, capturado un ej.

Fontcoberta, 2-1-71, capturado ej. joven con plumaje ya ligeramente moteado como un adulto.

Vilademí, 21-11-71, capturado un ej. En un bosque de esta localidad, observados varios nidos; de uno de ellos los habitantes de Can Llovera sacaron un pollo volandero y lo alimentaron con carne hasta Octubre de 1971, en que escapó.

Vilademí, 7-5-72, hallados 2 nidos ya viejos en bosque de encinas cerca de un pequeño remanso, en las proximidades de Can Llovera.

15. *Accipiter nisus*. Gavilán. Cat.: Esparver vulgar. (A)

Esponellà, 2-6-69, nido en un roble, inconfundible.

Fontcoberta, 16-11-69, capturado y naturalizado un ej.

Usall (Porqueres), 20-11-69, otro naturalizado.

Banyoles, observados ejes. en vuelo por los alrededores en varias ocasiones: 6-7-67, 9-9-67, 30-12-69, etc.

16. *Buteo buteo*. Ratonero Común. Cat.: Aligot comú. Loc.: Miseroca.

(A)

Rocacorba, 1963, naturalizados dos ejes. procedentes de dicha localidad.

Corts, 21-12-69, observado.

En la carretera de Camós, 28-12-69, remontándose a poca altura. Por su vuelo planeado son muertos frecuentemente por los cazadores.

En Diciembre 1968, tuvimos un ejemplar herido que fue convenientemente curado y vivió algún tiempo; mostraba muy poca aptitud para aprender algo.

Crespia, 21-5-71, identificado un nido en bosque de alcornoques, al observar durante varias semanas las evoluciones de un individuo. La hembra estaba incubando.

17. *Circus cyaneus*. Aguilucho Pálido. Cat.: Esparver d'estany. (RR)

Vilert (Esponellà), 9-67, creemos no equivocarnos señalando una observación; el ejemplar estaba posado en el suelo y se pudo distinguir perfectamente su conspicuo obispillo blanco. Levantó el vuelo de inmediato.

18. *Circus aeruginosus*. Aguilucho Lagunero. Cat.: Arpella vulgar. (R)

Son observados o capturados muy pocos ejes. Los que lo son han caído siempre al atardecer. En el lago de Espolla en 12-12-67 y 30-12-69, este último naturalizado.

19. *Circus gallicus*. Aguila Culebrera. Cat.: Àguila marcenca. (RR)

Usall, 5-63, visto un ej. por el agricultor A. SALA; tenía aferrada —según él— una culebra verde (muy abundante) y la remontó unos metros en el aire. Interrogado sobre coloración y obtenidos datos correctos, anotamos dicha observación como fidedigna.

20. *Falco peregrinus*. Halcón Común. Cat.: Falcó pelegrí. (R)

Porqueres, 7-7-68, creemos identificar un ej. (macho?) por su inconfundible ancho bigote.

Maliana (Fontcoberta), 6-7-70, dos ejes. jóvenes posados en un mismo árbol. No conseguimos localizar el nido pese a su búsqueda.

21. *Falco subbuteo*. Alcotán. Cat.: Falcó mostatxut. (R)

Fontcoberta, 18-7-73, en un terreno de cultivo con frutales, un cazador abatió de un disparo un ej. posado en uno de dichos árboles. Figura naturalizado en nuestra colección.

22. *Falco tinnunculus*. Cernícalo Vulgar. Cat.: Xoriguer gros. (E)
Naturalizados solamente dos ej. que, según datos de los cazadores, procedían de las zonas más secas denominadas «Les Costes», en Mata (Porqueres). Lo reputamos, no obstante de nidificación indudable en la comarca.
23. *Alectoris rufa*. Perdiz Común. Cat.: Perdiu roja. (E)
La intensa persecución de que son objeto por parte de los cazadores y las ineficaces repoblaciones efectuadas, van a la par para calificar pronto a esta especie como muy escasa. Al repoblar con aves mansas, éstas se acercan a lugares habitados y allí podemos imaginarnos su fin. Por otra parte, al no estar habituadas a sus enemigos naturales, caen con facilidad.
*Observados bandos que no rebasaban los 12 individuos en Martís --25-9-66--, Vilert --14-10-68--, y Mata --23-2-70-- así como dos ej. en Palol del Revardit en 16-9-71.
Martís, 21-5-72, hallado nido con huevos.
24. *Coturnix coturnix*. Codorniz Común. Cat.: Guatlla. Loc.: Gotlla. (A) o (E) según años.
Martís, 21-8-66; Corts, 30-9-69 y otras citas frecuentes en verano.
Martís, 21-5-72, hallado nido con huevos.
La caza con red es hecho más que frecuente.
25. *Grus grus*. Grulla Común. Cat.: Grua. (R)
Entre Usall y Esponellà (Can Guilera concretamente), han sido varios los ej. observados. Uno de ellos fue cobrado en invierno de 1967 y naturalizado por el taxidermista D. JOSE CRUELLS (e.p.d.).
26. **Rallus aquaticus*. Rascón. Cat.: Rascló. (E)
Nos consta su presencia en el lago de Banyoles por los cazadores aunque no hemos tenido ocasión de observarlo personalmente.
En noviembre de 1971, un ej. capturado por F. PLANELLS y que figura diseado en nuestra colección particular. En iguales mes y año, otra captura en Serinyà.
27. *Porzana porzana*. Polluela Pintoja. Cat.: Polla pintada. (R)
Lago de Banyoles, Porqueres, 11-1-70, vistos de cerca 2 ej.
28. *Gallinula chloropus*. Polla de agua. Cat.: Polla d'aigua. (A)
Es bastante frecuente en las orillas del lago de Banyoles y en las de los ríos e innumerables riachuelos de la comarca. Sus citas son abundantes y con frecuencia hemos hallado nidos. Los riachuelos con mayor número de observaciones y de nidificaciones son los afluentes del río Terri.
29. *Fulica atra*. Focha Común. Cat.: Fotja vulgar. (A)
El lago de Banyoles ofrece excelentes lugares para esta ave y son frecuentes las observaciones cuando comienza a salir el sol y al atardecer, sobre todo en el periodo de octubre a febrero. Suele verse frecuentemente en la mayoría de lugares con agua de la comarca. Anotamos, entre otras, la observación de 4 ej. el 30-10-66 en las cercanías de Can Morgat.
Banyoles (lago), 11-5-72, hallado nido con huevos.
Espollà, 20-8-72, hallado otro nido ya abandonado y con cáscaras de huevo, algo decoloradas.

30. *Vanellus vanellus*. Avefría. Cat.: Fredeluga. Loc.: Fredeluga. (A)
Observaciones invernales frecuentes en campos de labor arados recientemente. En uno cerca de «Les Tunes» (Porqueres), observamos unos 70 ej. en 27-11-66.
Pla de Martís, enero 1968, unos 200 ej. en dos bandos.
En febrero 1970 los campos de los alrededores del lago de Banyoles reciben constantemente sus visitas muy numerosas; las capturas llegan a hacerse incluso dentro de las casas próximas.
Cerca del río Ser, 19-3-70, observación de unos 20 ej.
31. *Charadrius dubius*. Chorlitejo Chico. Cat.: Corriol petit. (R)
Banyoles, diciembre 1962, capturado un ej. durante una nevada.
Lago de Espolla, julio 1972, 3 ej. adultos.
32. *Tringa totanus*. Archibebe Común. Cat.: Gamba roja vulgar. (RR)
Naturalizamos un ejemplar procedente de unos campos anegados en Borgonyà en enero 1968. Único dato que poseemos.
33. *Gallinago gallinago*. Agachadiza Común. Cat.: Becadell comú. (E)
Se capturaban bastantes ejemplares años atrás, cuando la laguna intermitente de Espolla (Fontcoberta) tenía abundante agua; en la actualidad escasea notablemente.
Fontcoberta, marzo 1966, muerto ej. inútil para naturalizar.
Banyoles, cerca del lago, captura de un ej. en enero 1970.
Cerca del río Ser, nueva captura en febrero 1970.
34. *Scolopax rusticola*. Chocha Perdiz. Cat.: Becada. (E)
Lago de Banyoles, 8-12-66, vistas dos en vuelo, inconfundibles.
Naturalizado ej. cazado en Fontcoberta en 4-1-70 y otro en 11-1-70.
Espinavessa, 22-10-72, observado un ej. corriendo por el suelo. Fecha muy temprana.
35. *Larus argentatus*. Gaviota Argétea. Cat.: Gavià argentat. (A) de noviembre a marzo.
Es curioso que la presencia de estas gaviotas (subsp. *michahelles*, o sea Patiamarilla) parece ser relativamente reciente en el lago de Banyoles, ríos, riachuelos y campos de la comarca. Antes podíamos calificarla como rara y actualmente podemos hacerlo como abundante, principalmente entre los indicados meses de noviembre a marzo. En verano hemos observado algún que otro ejemplar pero se trata de apariciones esporádicas. Comen mucha carroña y restos que hallan en abundancia en los vertederos de basura. También se posan en los campos arados pudiendo verlas en gran cantidad donde la tierra ha sido removida. Hemos observado que diariamente se trasladan desde puntos de la costa (probablemente de la zona La Escala, L'Estreit, islas Medes) hasta los de la comarca, descansando antes de partir, cada anochecer, en el centro del lago de Banyoles donde pueden contemplarse por docenas.
En febrero 1969 unos niños capturaron un ejemplar herido, que figura ahora naturalizado en el Museo Municipal Darder; la herida era de perdigonada.
En un campo próximo a la carretera de Gerona, una gaviota chocó en vuelo violentamente con unas cables eléctricos, cayendo herida; al intentar cogerla el agricultor PEDRO SALA, recibió un fuerte picotazo que le causó profunda herida.

36. *Larus ridibundus*. Gaviota Reidora Común. Cat.: Gavina vulgar. (A)

Cuando, hace ya unos años, comenzábamos el esbozo del presente trabajo, calificamos a esta gaviota como rara y es curioso como, al presente, la podemos señalar efectivamente como abundante. A partir del 20 de diciembre aproximadamente, se produce anualmente una invasión de estas aves, desplazando considerablemente a la Gaviota Argéntea.

El 4-1-71 obtuvimos un ejemplar alirroto para curarlo; el día 26 voló ya unos metros. Se alimentaba de pan —que le gustaba en extremo— y carne, siendo de destacar que prefería la procedente de animales de su misma especie. El día 29 la soltamos, emprendiendo el vuelo normalmente.

37. *Columba oenas*. Paloma Zurita. Cat.: Xixella. (E)

Años atrás era mucho más común pero, en la actualidad, sólo se ven algunos individuos a finales de febrero y principios de marzo.

38. *Columba palumbus*. Paloma Torcaz. Cat.: Tudó. (A)

Se capturan bastantes ejemplares y tenemos frecuentes citas.

Hemos comprobado que el Azor es uno de los mayores enemigos de esta especie.

Sant Miquel de Campmajor, 12-6-71, nidificación comprobada cerca del «Molí de Roca».

39. *Streptopelia turtur*. Tórtola Común. Cat.: Tórtora. (A)

Abundantes datos de ejemplares muertos por los cazadores en fechas primaverales y estivales.

La nidificación es indudable y tenemos referencias concretas de gentes del campo, si bien no hemos tenido ocasión de comprobarlo personalmente.

40. *Clamator glandarius*. Crialo. Cat.: Cucut reial. Loc.: Garsa borda. (R)

Solamente han llegado a nuestras manos 2 ejs., sin que podamos por el momento citar ninguna observación personal. Citas indirectas (pero que juzgamos exactas en cuanto a los datos) son las que siguen.

Banyoles, enero 1968, el cazador J. VINAIS abatió un ejemplar cerca del Cementerio Municipal, por la carretera de Figueras.

Porqueres, agosto 1970, se nos mandó naturalizar un ejemplar cazado en sus cercanías y que presentaba el plumaje de joven. Ello nos induce a suponer que algún nido de Urraca de aquellos lugares había sido parasitado por el Crialo.

41. *Cuculus canorus*. Cuco. Cat.: Cucut. (A)

Frecuente en la mayoría de bosques de la comarca, es más fácil oirlo que verlo.

Naturalizados 6 ejs. en septiembre de 1969 y agosto de 1970.

Su parasitismo (cría) es indudable aunque no hemos tenido ocasión de comprobarlo personalmente.

42. *Tyto alba*. Lechuza Común. Cat.: Òliba. (A)

Actualmente tenemos controladas y suponemos anidan en la población de Banyoles siete parejas repartidas según nuestras notas de la siguiente forma: Una pareja que dispone de la zona de la Plaza Turers anidando en la iglesia de las Carmelitas; en 4-9-69 cayeron en el centro de esta plaza dos Golondrinas heridas por una Lechuza que ofreció su blanco plumaje a nuestra vista. Lo que motivó el soltar a las Golondrinas no lo sabremos nunca.

En la Iglesia Parroquial anidan dos parejas según justifica el hecho de observar jóvenes con plumón en dos puntos de la misma.

En distintos lugares de la iglesia de la Providencia anidaban otras dos parejas pero últimamente sospechamos que sólo una se ha establecido.

En las paredes contiguas a la iglesia del Monasterio, otras dos parejas aunque sospechamos también mayor número de ejemplares que los controlados. Su grito semejante a un «tchhsssh» lo oímos diariamente.

En la comarca es el ave de presa nocturna más conocida, junto con el Mochuelo Común. A veces han causado daños en las granjas por el hecho de que, atraídas por algún ratón, han penetrado en ellas y los pollitos, asustados, se han amontonado y ahogado. Sin embargo se le reconocen generalmente sus méritos de gran destructora de roedores y animales perjudiciales para la agricultura.

43. **Otus scops*. Antillo. Cat.: Xot. (R)

No tuvimos noticias de la presencia de esta especie hasta el 12-11-71, por un ejemplar muerto en Palol del Revardit. No hay más citas.

44. *Bubo bubo*. Buho Real. Cat.: Duc. (RR)

Según los vecinos de Rocacorba, hace unos dos años todavía podía oírse su canto; actualmente no. La única cita, no personal pero que merece toda nuestra confianza, es la del cazador F. PLANELLIS que vio un ejemplar, al parecer adulto, posado cerca del río Terri. La descripción no podía ser más veraz.

45. *Athene noctua*. Mochuelo Común. Cat.: Mussol comú. (A)

Observados casi diariamente frente a nuestro domicilio, posados en unas antenas de televisión. A menudo gritan fuertemente. Las citas de observaciones por toda la ciudad de Banyoles y su comarca, posadas estas aves en los hilos de telégrafo, son muy numerosas. También son muy frecuentes las citas de nidificaciones, personalmente comprobadas.

El número de mochuelos habitantes dentro del casco urbano de Banyoles disminuyó notablemente con la destrucción de la parte antigua de la iglesia del Monasterio para levantar el nuevo edificio. Las nidificaciones eran allí más que frecuentes.

46. *Strix aluco*. Cárabo. Cat.: Gamarús. (E)

Solamente conocemos en la zona de Banyoles el Cárabo en la fase de color gris si bien, en zonas algo más elevadas —Fares, Besalú, Beuda, etc.— hemos registrado la presencia de la fase de coloración parda. Camós, 23-7-67, naturalizado.

Porqueres, 20-12-70, también naturalizado.

Banyoles, 16-8-71, asustado por el disparo de un cohete anunciando el comienzo de un Concurso de Pesca en el «Estanyol del Vilar», se levanta un ejemplar de un árbol próximo.

Otras varias citas. Su nidificación es indudable.

47. *Asio otus*. Buho Chico. Cat.: Mussol banyut. (E)

Palol de Revardit, septiembre 1966, un ejemplar disecado por un compañero aficionado a la taxidermia.

Puig d'En Colomer (Banyoles), 11-8-72, capturado y naturalizado un ej. joven.

48. **Caprimulgus ruficollis*. Chotacabras Pardo. Cat.: Siboc. (E)
Fontcoberta, 22-6-69, observación de un ej. en el crepúsculo, delante del automóvil.
Porqueres, 8-7-71, observados 2 ejcs. en vuelo rasante, al atardecer.
49. **Caprimulgus europaeus*. Chotacabras Gris. Cat.: Enganyapastors. (E)
Porqueres, mayo 1969, naturalizado un ejemplar muerto por un automóvil.
Cornellà del Terri, 17-8-69, observado en vuelo.
Corts, observaciones en 10, 17 y 24-7-71: a partir de las 12 de la noche se sitúan dos ejemplares en el mismo centro de la carretera, cerca de la población, y cuando se acerca algún vehículo levantan el vuelo. A partir de 20-8-71 ya no hay observaciones.
50. *Apus melba*. Vencejo Real. Cat.: Ballester. (MA)
Citas muy frecuentes en época veraniega. Abundan en algunos lugares concretos como Beuda, Besalú y Fares, donde hay una pequeña colonia establecida.
51. *Apus apus*. Vencejo Común. Cat.: Falciot negre. (MA)
Citas a diario en primavera-verano.
Nidificación en grietas de las paredes de la iglesia del Monasterio y, en menor número, en la de Santa María, en Banyoles.
52. *Aicedo atthis*. Martín Pescador. Cat.: Blauf. Loc.: Botiguer. (A)
La introducción de la especie piscícola anti-mosquito *Gambusia* en el lago de Banyoles, ha sido el factor que más ha contribuido a hacer proliferar a esta especie, siendo apreciable el número de «botiguers» que se alimentan de aquella presa, fácil para ellos. Citas varias muy frecuentes siendo habitual en los ríos de la comarca, sin excepción.
Nidificación comprobada en Fares el 18-8-71 y en Banyoles el 14-5-72.
53. *Merops apiaster*. Abejaruco Común. Cat.: Abellerol. Loc.: Abeller. (A)
Desconocido o muy raro hace unos diez o doce años, abunda ahora en la comarca y es uno de los favoritos de los coleccionistas por sus bellísimos colores metálicos. Causa verdaderos destrozos en las colmenas.
Citas muy frecuentes en verano. Comprobada su nidificación en colonias reducidas de pocos agujeros y relativamente separados, en las márgenes de ríos en Esponellà, Fontcoberta y Fares (donde les llaman «musics de Fares»).
54. *Coracias garrulus*. Carraca. Cat.: Gaig blau. (RR)
Espinaressa (Cabanellas), 29-7-73, un ej. levanta el vuelo posándose en un pino, donde pudo observarse a placer. Primera y única cita hasta ahora en la comarca.
55. *Upupa epops*. Abubilla. Cat.: Puput. (A)
Es un ave muy frecuente en verano por toda la comarca, teniendo anotados un sin fin de datos de primeras observaciones primaverales de llegada: la más temprana es de 14-3-69.
Nidificación comprobada el 11 y 14-5-72 en Banyoles.
56. **Jynx torquilla*. Torcecuello. Cat.: Colltort. (E)
Parece ser que las zonas donde más abunda están situadas desde

Porqueres hacia el N., siendo más bien raras las citas en Banyoles, Camós, Cornellà del Terri, Palol, etc.

Vilert, 18-7-69, observado uno en el suelo.

Porqueres, 12-10-71, un ej. muerto por E. MARÉS en «Les Tunes».

57. *Picus viridis*. Pito Real. Cat.: Picot verd. (A) a (E)

Señalamos la cada vez mayor escasez de esta ave cuyas observaciones van disminuyendo progresivamente. Si no se responsabiliza a los cazadores, parece que pronto deberemos anotar como «rara» a esta bella especie.

Observaciones muy frecuentes en los bosques de Camós y Palol del Revardit. También puede oírse frecuentemente en bosques de Beuda. La nidificación ha sido, naturalmente, comprobada en varias ocasiones.

58. *Dendrocopos major*. Pico Picapinos. Cat.: Picot garser gros. (R)

Sólo tenemos dos citas de esta especie:

«La Perpinyana», enero 1967, por referencia de cazadores.

Fares, 7-11-71, observación personal de un ej., al parecer herido.

59. *Melanocorypha calandria*. Calandria. Cat.: Calàndria. Loc.: Calandri. (E)

Èsponellà, observaciones en 26-7-71 y 18-8-71.

Porqueres, observada en 16-4-72.

60. *Calandrella cinerea*. Terrera Común. Cat.: Terrerola vulgar. Loc.: Tit de terra. (A)

Frecuentes citas y capturas abundantes, principalmente en fríos inviernos.

Nos faltan datos primaverales.

61. *Galerida cristata*. Cogujada Común. Cat.: Cogullada vulgar. (MA)

Observaciones todo el año pero más frecuentes en otoño-invierno en todos los campos abiertos de la comarca. Capturas muy frecuentes.

62. *Lullula arborea*. Totovía. Cat.: Cotoliu. Loc.: Cogullada petita. (A)

Menos abundante que la especie precedente, tenemos no obstante datos muy frecuentes, sobre todo de otoño e invierno,

63. *Alauda arvensis*. Alondra Común. Cat.: Alosa vulgar. Loc.: Loua. (A)

Citas muy frecuentes en los campos de la comarca.

Capturados pollos volanderos en varias ocasiones.

64. *Hirundo rustica*. Golondrina Común. Cat.: Oreneta vulgar. (MA)

Muy conocida, abunda en la comarca tan útil ave.

Nidificación comprobada cada año, de mayo a junio, en Banyoles, Fontcoberta, Corts, Èsponellà, etc.

65. *Delichon urbica*. Avión Común. Cat.: Oreneta cuablanca. (MA)

Crían en Banyoles en varios aleros dentro del casco urbano, siendo muy conocidas las colonias situadas en las calles de Èscribanias y Puig. Han intentado establecerse en otros lugares pero la gente destruye sus nidos quejándose de que sus excrementos ensucian balcones y paredes.

66. *Muscicapa striata*. Papamoscas Gris. Cat.: Papamosques gris. (A)
Esponella, 22-9-69 y otras citas frecuentes en Banyoles, Camós y otras localidades.
67. *Ficedula hypoleuca*. Papamoscas Cerrojillo. Cat.: Mastegatxex. (A)
Capturamos un ej. en 22-1-69 que debía ser joven, presentando en el abdomen coloración de listas pardas.
68. *Regulus regulus*. Reyezuelo Sencillo. Cat.: Reietó. (E) a (R)
Tanto esta especie como la siguiente son en la actualidad considerablemente escasas; probablemente los insecticidas no son ajenos a ello.
Hay observaciones invernales (enero a marzo) en Fares, Beuda, etc.
69. *Regulus ignicapillus*. Reyezuelo Listado. Cat.: Bruel. (E)
Corts, 24-11-68, capturado ej. que conservamos en la colección.
Camós, 14-3-72, observados 3 ejes.
70. *Phylloscopus collybita*. Mosquitero Común. Cat.: Mosquiter groc petit. Loc.: Busqueta. (A)
Tanto esta especie como los otros tres mosquiteros que siguen son abundantes en la comarca. Daremos tan sólo una observación de cada una de tales especies.
Porqueres, 22-9-69, identificado por la voz y posterior observación.
71. *Phylloscopus trochilus*. Mosquitero Musical. Cat.: Mosquiter groc gros. Loc.: Busqueta. (A)
Fontcoberta, 28-11-69 (y Banyoles, en igual fecha).
72. *Phylloscopus bonelli*. Mosquitero Papialbo. Cat.: Mosquiter pàllid. Loc.: Busqueta. (A)
Fontcoberta, 29-11-71, observado ejemplar.
73. *Phylloscopus sibilatrix*. Mosquitero Silbador. Cat.: Mosquiter xiulaire. Loc.: Busqueta. (A)
Banyoles, 18-10-71.
74. **Sylvia atricapilla*. Curruca Capirotada. Cat.: Tallarol de casquet. (A)
Observaciones abundantes de octubre a marzo (y en ocasiones hasta abril) en huerto propio.
75. *Sylvia undata*. Curruca Rabilarga. Cat.: Tallareta cuallarga. (E)
Porqueres, 4-12-66, observados dos ejemplares.
76. *Cettia cetti*. Ruiseñor Bastardo. Cat.: Rossinyol bastard. Loc.: Rossinyol d'aigua. (A)
Observado frecuentemente en carrizales próximos al lago.
Nidificación comprobada en Banyoles (lago) el 21-5-72.
77. *Luscinia megarhyncha*. Ruiseñor Común. Cat.: Rossinyol. (A)
A partir de mayo pueden escucharse frecuentemente los maravillosos gorjeos de esta ave en bosques, setos, árboles, etc.
Nidificación comprobada el 2-6-71 en jardín urbano de Banyoles.

78. **Erethacus rubecula*. Petirrojo. Cat.: Pit-roig. Loc.: Rei. (A)
Citas a diario en los inviernos por la ciudad y, en las demás estaciones, por los bosques cercanos.
79. *Phoenicurus phoenicurus*. Colirrojo Real. Cat.: Cotxa cua-roja. (I)
Observaciones en Camós, 20-11-66 y Esponellà, 23-11-69.
80. *Phoenicurus ochruros*. Colirrojo Tizón. Cat.: Cotxa fumada. Loc.: Carboner. (A)
Muchas observaciones en los huertos cerca de Banyoles y en invierno (por ejemplo, 6-1-70).
81. *Saxicola torquata*. Tarabilla Común. Cat.: Bitxac comú. (A)
Disecado un ej. procedente de la comarca en diciembre 1964.
Observaciones en Corts, 28-7-69 y muchas otras.
Camós, 16-5-72, nidificación comprobada en el suelo de un campo de alfalfa. El nido contenía 4 huevos fuertemente moteados de pardo oscuro. Al aproximarnos sale la hembra, que regresa al cabo de unos minutos, al alejarnos.
82. **Oenanthe oenanthe*. Collalba Gris. Cat.: Còlit gris. (ME)
Atribuimos a esta especie la observación efectuada en 18-5-69 cerca de Crespià.
83. *Oenanthe hispanica*. Collalba Rubia. Cat.: Còlit ros. (E)
Observaciones en Corts, 16-2-69, y Banyoles, 11-1-70.
Capturado ejemplar por ENRICH MARÉS en 15-6-71.
Banyoles, 14-5-72, observados 2 ejes. jóvenes lo que hace suponer cría, quizá temprana, aunque sin localizarse el nido.
84. **Turdus viscivorus*. Zorzal Charlo Cat.: Griva. (E)
Señalamos a esta especie como escasa actualmente, aunque recordamos las bandadas observadas en los años 1964 y 1965 en los campos cercanos al lago de Banyoles. Ahora son raras las observaciones en grupos de más de 20 a 30 individuos.
Fontcoberta, 19-1-69 y 4-1-70, bandos de menos de diez ejes.
Banyoles, 18-1-70, observación de unos 15 individuos, la más numerosa de las observaciones recientes.
85. *Turdus pilaris*. Zorzal Real. Cat.: Griva cerdana. (Ocasionalmente A)
Única cita es la de unos grupos posados en el suelo cerca de «Les Tunes» (Porqueres) en diciembre 1968.
86. *Turdus philomelos*. Zorzal Común. Cat.: Tord comú. (A)
Sin menospreciar el número actual de esta especie, la muerte de los olivos en el denominado «any del fred» (año del frío) contribuyó a alejar a los zorzales a otros lugares donde hallan comida abundante.
Observaciones en Banyoles el 16-12-71 y otras.
Camós, 16-5-72, nido a medio construir y aún sin huevos.
87. *Turdus musicus*. Zorzal Alirrojo. Cat.: Tord ala-roig. (II)
Banyoles, 12-12-66, naturalizado ejemplar procedente de los alrededores.

Banyoles, 12-1-71, observados cerca del lago unos 10 ej., junto a varias Avefrías.

88. *Turdus merula*. Mirlo Común. Cat.: Merla. (A)
Porqueres, 20-11-66, 20-12-69 y otras muy abundantes observaciones.
Banyoles, 17-5-72, hembra empollando, no lejos de Porqueres.
89. **Troglodytes troglodytes*. Chochín. Cat.: Cargolet. Loc.: Ull de bou. (A)
Banyoles; registramos su presencia diaria en el huerto casero y otros lugares, desde noviembre a marzo.
90. *Cinclus cinclus*. Mirlo Acuático. Cat.: Merla d'aigua. Loc.: Merlot cabussó. (E)
Desde una observación de las evoluciones de 2 ej. en los parajes de la «Font de la Carpa» (Desmais) en el lago, viendo sumergirse a uno para después salir con algo en el pico, solamente tenemos una segunda observación, el 27-2-72, de un ejemplar posado en el borde de un riachuelo de desagüe en el lago de Banyoles, con abundante vegetación. Bien observado durante varios minutos.
91. **Prunella modularis*. Acentor Común. Cat.: Pardal de bardissa. (MA)
Carretera de Esponellà, 30-11-69 y muchas otras citas.
El 12-6-71 capturamos personalmente, en Pares, un ejemplar muy joven, con mucho plumón, que saltó de unos setos; por la forma del pico y otros detalles, aparte de que en el lugar en cuestión son muy frecuentes los Acentores, lo clasificamos como tal. No obstante, al quedar la comarca fuera del área normal de cría, lo señalamos sólo como verosímil.
92. *Anthus pratensis*. Bisbita Común. Cat.: Titella. Loc.: Tit de terra. (A)
Observaciones muy frecuentes.
Banyoles, 21-12-69 y muchas otras citas invernales en toda la comarca.
93. *Anthus campestris*. Bisbita Campestre. Cat.: Trobat. (E)
Banyoles, 12-11-69, capturado un ejemplar en un huerto.
Cercanías de Crespià, 18-11-71, ejemplar posado en unas rocas lindantes a un campo anegado.
94. *Anthus trivialis*. Bisbita arbóreo. Cat.: Piula dels arbres. (E)
Camós, 16-11-69, observado.
Banyoles (lago), 22-12-71, capturado un ej. con una sola pata. Probablemente la otra, cortada a la altura superior del tarso, lo fue por algún disparo.
95. **Motacilla alba*. Lavandera Blanca. Cat.: Cuereta blanca. Loc.: Cueta. (A)
Citas muy frecuentes en épocas de otoño e invierno por la comarca.
En las demás estaciones es posible observar algún individuo cerca de Rocacorba y también en Pujarnol (12-5-72).
96. **Motacilla cinerea*. Lavandera Cascadeña. Cat.: Cuereta torren-tera. (E)
Banyoles, 16-11-69, única cita registrada, aunque nos consta su presencia en los alrededores.

97. *Motacilla flava*. Lavandera Boyera. Cat.: Cuereta groga. (A)
 Durante 6 días seguidos (20 a 25-1-70) observado cada día un ej. en el jardín casero, en Banyoles, que recogía la ración cotidiana de gusanos que al efecto le preparábamos.
 Sin duda las observaciones más frecuentes son en otoño, por ejemplo, en Banyoles, en 1971.
98. *Lanius excubitor*. Alcaudón Real. Cat.: Botxí. Loc.: Garsa marina. (E)
 Banyoles, 11-11-68, observación rápida de un ejemplar, atrapando una lagartija.
99. **Lanius minor*. Alcaudón Chico. Cat.: Trenca.
 Esponellà, 12-7-68, observado un ejemplar joven en el cual, con los prismáticos, no vimos listas en el pecho; este hecho nos hizo descartar se tratase de Alcaudón Real y anotarlo, con ciertas reservas, como joven de Alcaudón Chico.
 Se conoce ya la cría de esta especie en área restringida del NE de Cataluña pero esta observación ampliaría bastante el área.
100. *Lanius senator*. Alcaudón Común. Cat.: Capsigrany. (E)
 Banyoles, 10-10-69, un ej. atrapado por un pajarero en las redes destinadas a Jilgueros.
 Banyoles (Can Puig), invierno de 1971, capturado un ejemplar por E. MARÉS; fue naturalizado.
 Observaciones en Crespià y Espinavessa los días 10 y 17-9-72 respectivamente.
 Por referencias fidedignas, su nidificación es indudable pese a no haberla comprobado personalmente.
101. *Lanius collurio*. Alcaudón Dorsirrojo. Cat.: Escorxador. (E) tendiendo a (R).
 Camós, 16-3-69, observado un ej. entre unos espinos.
102. *Parus caeruleus*. Herrerillo Común. Cat.: Mallerenga blava. (MA)
 Las observaciones invernales son diarias en huertos, parques, jardines, etc.
 En primavera-verano construyen sus nidos preferentemente en los bosques.
 Proqueres, 12-7-71, nido viejo.
103. *Parus major*. Carbonero Común. Cat.: Mallerenga carbonera. (A)
 También muy frecuente, con observaciones todo el año. No nos ha sido posible sin embargo, hasta ahora, ver ningún nido en nuestra comarca.
104. **Parus cristatus*. Herrerillo Capuchino. Cat.: Mallerenga emplomada. Loc.: Mallerenga de la Mare de Déu del Mont. (A)
 Escasa en los alrededores de Banyoles, habiendo registrado solamente una observación (Porqueres, 18-4-72), es abundante en cambio en zonas más altas como Besalú, Fares y Beuda, registrando observaciones a menudo, algunas de ellas en primavera con verosímil nidificación.
 Creemos no incurrir en error al señalar las pequeñas migraciones o desplazamientos estacionales que efectúa esta especie desde las zonas más

altas —antes mencionadas— hasta las más bajas, más cálidas, para nidificar. El hecho de efectuar alguna observación primaveral en la que estas aves iban por parejas en Porqueres (zona baja) corrobora lo antes dicho.

105. *Panarus biarmicus*. Bigotudo. Cat.: Mallerenga de bigotis. (RR)

De no haber visto un ejemplar disecado y capturado por nuestro buen amigo D. BARTOLOME PARRÓ, en Olot, hubiéramos puesto en duda —pese a su claridad— la observación que hicimos cerca de Besalú, el 22-12-71, de una de estas aves posada cerca de unos setos en una arboleda de chopos.

106. *Aegithalos caudatus*. Mito. Cat.: Mallerenga cuallarga. (MA)

Observaciones más que frecuentes en todas las estaciones del año. Su nidificación es indudable pero, por más que hemos buscado, no hemos podido hallar todavía ningún nido.

107. *Emberiza calandra*. Triguero. Cat.: Cruixidell. (A)

Anotamos muy frecuentes observaciones por la comarca en primavera y verano, siendo indudable su nidificación.

108. **Emberiza cirius*. Escribano Soteño. Cat.: Gratapalles. (A)

Pla de Martís, 15-5-69, observación de 4 ej. en el suelo.

Fares, 22-11-70, capturado un ej. que figura en nuestra colección.

109. **Emberiza cia*. Escribano Montesino. Cat.: Sit negre. (A)

Porqueres, 11-5-71, capturado un ej. por D. ENRIC MARÉS y que figura naturalizado en nuestra colección.

Porqueres, 12-5-72, observados tres ejemplares.

Por las fechas de observación es verosímil su nidificación.

110. *Coccothraustes coccothraustes*. Picogordo. Cat.: Durbec. (A)

Corts, 22-11-69 y muchas otras citas. Frecuentemente naturalizados, por su contenido estomacal notamos una especial afición por el sorgo tierno.

Porqueres, 20-2-72, observado cerca de la iglesia durante una excursión colectiva de la Sec. Reg. Catalana de la S.E.O.

111. *Carduelis chloris*. Verderón Común. Cat.: Verdum. (A)

Abundante en la comarca, las cada vez más frecuentes capturas de los pajareros nos hacen temer pase pronto a ser escaso.

Nidificaciones comprobadas en Banyoles y Porqueres los días 18 y 19-5-72, respectivamente.

112. *Carduelis carduelis*. Jilguero. Cat.: Cadernera. Loc.: Cardina. (A)

Muy abundante según épocas, son numerosas las citas de nidificación, criando todos los años, incluso en lugares céntricos de Banyoles.

En noviembre 1969 observamos un bando de más de 60 individuos en un campo de maíz poblado de «caps blancs», comiendo en abundancia su semilla.

113. **Carduelis spinus*. Lúgano. Cat.: Lluer. (A)

Observaciones numerosas, sobre todo en invierno en que se acerca más a las casas. En nuestro jardín, en Banyoles, anotamos casi cada año la presencia en febrero de numerosos, uno de ellos naturalizado en nues-

tra colección. Comen la semilla que queda después de haberse secado los ligos del suelo.

En Pontcoberta, el 22-5-72, observado un ej. que hacía numerosas evoluciones en torno a un ciprés, comprobándose su salida a intervalos de dos minutos; creemos apreciar un nido muy alto. Aunque la zona no se halla en área de cría, nos llama la atención el hecho que podría indicar cría.

114. *Acanthis cannabina*. Pardillo Común. Cat.: Passerell comú. (L)

El uso abusivo de herbicidas ha ocasionado pérdidas de medios de alimentación a estos fringílidos, siendo cada vez menor su número.

Banyoles, 12-5-72, observado nido en construcción.

115. **Serinus serinus*. Verdecillo. Cat.: Gafarró. (A)

Esponellà, 25-10-64 y otras muchas citas.

No hemos podido localizar nido alguno aunque su nidificación es más que verosímil.

116. **Pyrrhula pyrrhula*. Camachuelo Común. Cat.: Pinsà borroner. (R)

Porqueres, 11-8-66, observaciones.

Naturalizados ejemplares capturados en 22-11-66, 19-12-66 y varios más.

En abril de 1971 observamos unos 14 ej. en Porqueres, comiendo flores de olmo. Otras observaciones similares en 1972.

Por las citas de primavera-verano, podemos suponer su nidificación verosímil pese a ser zona ya fuera del área normal.

117. *Loxia curvirostra*. Piquituerto Común. Cat.: 'Trencapinyes comú. (RR)

Sant Miquel de Campmajor, 12-12-67, hembra capturada y naturalizada.

Pese a ser frecuente en otros puntos del Ampurdán, esta especie es de muy rara aparición en esta comarca.

118. *Fringilla coelebs*. Pinzón Vulgar. Cat.: Pinsà comú. (MA)

En otoño e invierno, observaciones casi diarias en huertos, campos, arboledas, etc., a veces compartiendo la comida con los gorriones.

No hay datos de cría en la comarca, de donde desaparecen en febrero o marzo y no regresan hasta octubre.

119. *Passer domesticus*. Gorrion Común. Cat.: Pardal comú. (MA)

Es el ave más común de la comarca, siendo devastadoras sus comilonas en lugares de grano maduro o ya almacenado. Las coloraciones presentan, a veces, notables diferencias en sus oscuros y negros.

En Camós, concretamente desde La Perpinyana hasta el término de Porqueres, han sido capturados varios ej. albinos, uno de los cuales (de noviembre de 1968) figura naturalizado por nosotros en la colección de D. LLUIS FERRANDO.

120. *Passer montanus*. Gorrion Molinero. Cat.: Pardal xarrec. (A)

Banyoles, 24-1-70, capturado un ej. que figura en nuestra colección. Nidificación en colonia comprobada en una pared vieja en Banyoles.

A menudo se aplica en la comarca incorrectamente el nombre catalán de Pardal roquer a esta especie, por transposición del Gorrión Chillón (*Petronia petronia*) aquí muy escaso.

121. *Petronia petronia*. Gorrión Chillón. Cat.: Pardal roquer. (E)

Localizamos su presencia hacia la parte Norte de la comarca pero, pese a ello, lo consideramos ave escasa.

Sta. María del Collell (Sant Miquel de Campmajor), observados 4 ej. hacia mediados de febrero de 1972.

122. *Sturnus vulgaris*. Estornino Pinto. Cat.: Estornell vulgar. (MA)

Observado siempre desde finales de octubre o más bien noviembre hasta finales de febrero. En marzo escasea notablemente. Capturado un ej. en Fares el 12-10-71 por D. ENRIC MARÉS; fecha temprana pero que, con algunas observaciones primaverales en los últimos años, nos llevó a pensar en posible cría, como lo hacía ya en otros puntos de la provincia.

Tal supuesto quedó confirmado cuando, del 21-4-73 al 9-5-73, pudimos observar continuamente en pleno casco urbano de Banyoles y más concretamente en la «torre de Can Lavall» (c. Escribanías) las idas y venidas de un par de individuos por el tejado, con clara observación —con prismáticos— de ceba entre unas tejas y, finalmente, captura (por los propietarios de la finca) de un pollo emplumado el 9-5-73.

123. *Oriolus oriolus*. Oropéndola. Cat.: Oriol. (E)

Vilert, 13-7-69, vistos dos ej. en vuelo.

Esponellà, agosto 1970, nidificación comprobada.

124. *Corvus corax*. Cuervo. Cat.: Corb. (E)

Su presencia se hace notar a menudo en los vertederos de basuras.

Can Vinardell (Banyoles), 12-12-69 y 19-3-70.

Crespià, 15-5-72, dos ej. en vuelos acrobáticos nupciales.

125. **Corvus corone corone*. Corneja Negra. Cat.: Cornella negra. (E)

Banyoles, 18-5-72, observación de 3 ej. posados.

126. *Corvus monedula*. Grajilla. Cat.: Gralla. (MA)

Principalmente en los meses de invierno, cruzan la ciudad de Banyoles en vuelo bajo un centenar de individuos dirigiéndose a los dormideros situados en los chopos de las orillas del río Terri.

Esponellà, a orillas del río Fluvià, en una construcción deshabitada, el 15-5-72 un ej. joven bate las alas violentamente y se posa finalmente en unos arbustos. El 22-5 observamos en las paredes de dicho lugar y mediante prismáticos, a varios jóvenes con visible plumón gritando desahoradamente entre varios adultos, uno de ellos con algo en el pico (quizá carroña?).

127. *Pica pica*. Urraca. Cat.: Garsa. (MA)

Podemos hallar a la Urraca en todas partes. En noviembre de 1969 y en lo alto de los plátanos —sin hojas en tal época— que bordean el lago de Banyoles, pudimos contar 23 nidos viejos.

Serinyà, 26-12-70, curioso vuelo de unos 70 ej. concentrados por ignorada causa.

128. *Garrulus glandarius*. Arrendajo Común. Cat.: Gaig. (A)

Vistos muy frecuentemente y casi siempre en cortos vuelos en Les Tunes (Porqueres), Corts, Camós, Fontcoberta, Crespià, Esponellà, etc.

Porqueres, 12-5-72, observamos un ave ocupada en el transporte de material, repetidas veces. Iba en línea recta hacia el Norte, se posaba luego en una higuera para observar y emprendía después el mismo camino pero al revés, demostrando la habitual habilidad de esta especie para esconder el nido.

VII - ALGUNAS ESPECIES NO INCLUIDAS

Por las razones que en cada caso detallamos, no se han incluido en la precedente Lista Sistemática unas pocas especies cuya presencia en la comarca ofrece alguna duda. Consideramos no obstante de interés reseñarlas por si en el futuro se nos depara ocasión de confirmar su presencia.

Aquila chrysaetus. Aguila Real. Cat.: Àguila daurada.

El Dr. MASCARÓ, en su «*Topografía Médica de Banyolas*» publicada en 1913, cita a esta rapaz como ave común en nuestra comarca. No sabemos si por aquel entonces lo era, cosa que nos atrevemos a poner en duda pero, actualmente, ha desaparecido totalmente y sólo creemos posible alguna presentación esporádica y rarísima.

Aythya ferina. Porrón Común. Cat.: Ànc cap-roig.

Nuestro amigo, el cazador D. JOSEP PLANA PAREK, de Banyoles, nos dio detalle de una captura en época de caza por los alrededores de la ciudad. Comprobamos detalles con la «*Guía de Campo*» y coincidieron plenamente. La pieza no fue disecada y ello impide la final confirmación.

Porzana parva. Polluela Bastarda. Cat.: Rasclétó.

En septiembre de 1969 naturalizamos un ejemplar para una persona que actualmente vive en Francia. Ello nos ha impedido poder reconsiderar y analizar detalles de esta cita.

Pyrhhorax pyrrhhorax. Chova Piquirroja. Cat.: Gralla de bec vermell.

En años de intenso frío algunos agricultores y cazadores nos han señalado la presencia de algún ejemplar de ave «negre amb bec vermell» (negro con pico rojo). Ante un ejemplar naturalizado de esta especie, su identificación ha sido positiva.

VIII - CONSIDERACIONES FINALES

El bello lago de Banyoles es, sin lugar a dudas, un magnífico habitat para especies que buscan en él refugio para vivir y nidificar. La fauna comarcal tiene en el lago un último reducto que sólo el hombre puede destruir con su contaminación o con programas urbanísticos sin freno. Nuestra conciencia debe hacernos alertar contra todo aquello que atente a nuestra riqueza faunística. La reciente construcción de caminos de circunvalación supone un aumento de las posibilidades de goce natural del agua multicolor pero, en contrapartida, ha destruido parte importante de otra riqueza que no se puede lograr con excavadoras ni con dinero.

Esta aportación ornitológica pretende, sinceramente, dar a conocer también a los profanos, algo que debemos legar a nuestros hijos sin que puedan hacernos reproches de insensibilidad ante lo que, gratuita y generosamente, nos brinda la Naturaleza y que intentamos conservar a toda costa.

Nuestro toque de alerta va también dirigido a los demás lugares de la comarca que con nuestro mayor interés hemos estudiado: «L'Estanyol de la Cendra», la laguna intermitente de Espolla, «L'Estanyol del Vilar», los cañizales de los afluentes del Terri, etc., que damos a conocer convencidos de que, la mayoría de las veces, nuestras riquezas naturales se pierden por inconsciencia y por falta de información.

Quisiéramos ser optimistas en muchos otros aspectos como la caza pero, solamente cuando quien salga al campo conozca bien a sus pobladores del reino animal podremos empezar a sentirnos satisfechos.

Nuestro futuros ornitólogos darán fe de los números comparativos en próximos años. No hemos cumplido sin embargo la misión totalmente. Hay todavía muchos detalles a aclarar, enigmas a resolver, datos a determinar. Esta será su misión. Si reciben más apoyo e interés, algo se habrá logrado. Aquí dejamos, por ahora, esta nuestra aportación.

AGRADECIMIENTO

Al finalizar este trabajo, deseamos hacer constar nuestro muy especial agradecimiento al querido amigo SALVADOR MALUQUER MALUQUER, por la supervisión del mismo, orientaciones que en todo momento nos ha facilitado y por sus desplazamiento a Banyoles para contribuir a aclarar nuestras dificultades en algunos casos especiales.

Asimismo debemos agradecer la colaboración de campo prestada por nuestros amigos ENRIC MARÉS, F. JULBE, M. PORTELLA, J. DARANAS, L. FERRANDO y a cuantas personas nos han facilitado datos y ejemplares.

Nuestro especial reconocimiento también a los servicios de Don JOSEP BLANCH COLL y Don FRANCESC XAVIER BUTINYÀ CARRERA por las aportaciones bibliográfica y fotográfica, respectivamente.

También al «Centre d'Estudis Comarcals» y a la Junta del Museo Municipal Darder así como a su encargada, Srta. L. MARÍN, queremos hacer constar nuestro agradecimiento por las facilidades otorgadas en todo momento.

BIBLIOGRAFIA

- BERNIS, F. — 1954. Prontuario de la Avifauna Española (incluyendo aves de Portugal, Baleares y Canarias). *Ardeola* 1. 11-85, Madrid.
- CODINA REIG, F. & J. PARRAMON MARBA. — 1969. Notas ornitológicas de la comarca de Solsona (prov. de Lérida). *Miscelánea zool.*, 2 n.º 4. 51-56, Barcelona.
- CONSTANS, L. G. & M. D. — 1951. *Bañolas*. Excmo. Ayuntamiento de Bañolas.
- FARRIOL I MONTSERRAT, J. — 1965. Banyoles vora el llac. *Bibl. selecta*, n.º 388, Editorial Selecta, Barcelona.
- FRANK BATLLER, J. — 1967. Al vent! *Natura* II. Hogar del Libro S.A., Barcelona.
- INSTITUTO JUNGLA. — 1959. *Aves y Mamíferos de España*, Madrid.
- MASCARO, J. M. — 1913. *Topografía Médica de la Comarca de Bañolas*.
- MESTRE RAVENTOS, P. — 1971. Contribución a un estudio ornitológico del valle de Campredón (Gerona). *Miscelánea Zool.* 3, n.º. 1. 65-76. Barcelona.
- PETERSON, R., G. MOUNTFORT & P. A. D. HOLLON. — 1967. (2.ª ed.) *Guía de campo de las aves de España y demás países de Europa*. Trad. y Adapt. de M. GONZÁLEZ DÍEZ. XXXVIII + 416 pp., Ediciones Omega, S.A., Barcelona.
- RIGAU RIGAU, A.M. — 1952. *El lago de Bañolas*.