

## Notas malacológicas

POR

C. ALTIMIRA

(14). *Pseudomelampus exiguus*, Lowe, en Canarias.

Habiéndonos cedido para su estudio un lote de dos conchas procedentes de Santa Cruz de La Palma, isla de La Palma, Canarias, recogidas por los Srs. ARROCHA LORENZO y enviadas por ellos al Sr. J. BOT, hemos procedido a ello.

De completo acuerdo con B. S. KISCH en su nota sobre *P. exiguus* en la cual incluye *P. biscayensis* FISCHER en su sinonimia, y apunta el parecer del Dr. MORRISON de que las formas *Pseudomelampus kochi* y *P. jolyi* PALLARY han de pasar también a la sinonimia de *P. exiguus*; habiendo revisado la publicación de FISCHER, su descripción y figura así como las fotografías que KISCH da en su nota, podemos identificar el ejemplar que poseemos en nuestra colección particular con la figura que de *P. biscayensis* da FISCHER en 1899 y con la fotografía n.º 2 del estudio de KISCH.

Concha no umbilicada, compuesta de 5,5 vueltas de crecimiento muy lento excepto la última que ocupa cerca de las 4/5 de su altura total. Apice prominente y mamelonado; vueltas embrionales blanquecinas, las siguientes de color córneo; estriación espiral visible a partir de la segunda vuelta, aunque en la última y desde su parte media es casi puntiforme. Estriación vertical remota. Labio interno engrosado en su parte frontal al pliegue parietal inferior. Dos pliegues parietales, el superior debil; potente el inferior. Pliegue columelar bien conspicuo, oblicuo. Altura, 4,1 mm., ancho, 2 mm.

Conceptuamos a *Pseudomelampus exiguus* como forma a incrementar la fauna malacológica de las islas Canarias.

### OBRAS CONSULTADAS

- FISCHER, H. 1899. — Note sur la présence du genre *Melampus* dans le Golfe de Gascogne. *J. Conchyl.* 47, p. p. 55-56. fig. 1.
- KISCH, B. S. 1953. — *Pseudomelampus exiguus* LOWE sur la Cote Basque. *J. Conchyl.* vol. XCIII, fasc. 111.